

**GOBIERNO
FEDERAL**



SALUD

SEDENA

SEMAR

Guía de Referencia Rápida

diagnóstico y Tratamiento de la
dermatitis seborreica en menores de 18
años

GPC

Guía de Práctica Clínica

Número de Registro SSA-205-09

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL



Dermatitis seborreica L21, L21.0 Seborrea capitis. Costra de leche
L21.1 Dermatitis Seborreica Infantil, L21.8 Otras Dermatitis Seborreicas

GPC

Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis seborreica en menores de 18 años

Número de registro SSA-205-209
ISBN en trámite

PREVENCIÓN SECUNDARIA

HISTORIA CLÍNICA

Realice una historia clínica completa, incluyendo edad de aparición de las lesiones

EXPLORACIÓN CLÍNICA

Escama amarillenta, oleosa, adherente, sobre una base eritematosa en región retroauricular, sobre la fontanela anterior, cuello, axilas, ingles, glúteos

DIAGNÓSTICO

Clínico: presencia de las lesiones mencionadas

ESTUDIOS DE LABORATORIO

- No se requieren

ESTUDIOS DE IMAGEN

- No se requieren

CRITERIOS DE REFERENCIA

Casos que requieren referencia al dermatólogo y al pediatra:

- Lesiones diferentes de las mencionadas
- Lesiones iguales a las mencionadas en sitios diferentes
- Síntomas sistémicos
 - Dificultad para la ganancia ponderal
 - Infecciones recurrentes
 - Falta de respuesta al tratamiento
 - Fiebre

TRATAMIENTO

Tratamiento tópico:

- Ketoconazol al 2% en shampoo 2 veces al día en las lesiones

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

- 4 a 12 semanas

LO MÁS IMPORTANTE EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS SEBORREICA EN EL MENOR DE 18 AÑOS ES EFECTUAR ADECUADAMENTE EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON INMUNODEFICIENCIAS GRAVES Y TRASTORNOS INFLAMATORIOS COMO LA HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS

ANTIMICÓTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS SEBORREICA EN MENORES DE 18 AÑOS

Medicamento	Concentración (%)	Aplicaciones/día
Ketoconazol shampoo	2	2

ABORDAJE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA DERMATITIS SEBORREICA EN EL MENOR DE 18 AÑOS

